

LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE SIN RECETA 2019

No.	Nombre Genérico	Concentración máxima	Forma Farmacéutica	Observaciones / Recomendaciones
AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS				
1	PROPINOX CLORHIDRATO	Hasta 20 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / CÁPSULAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
2	PROPINOX CLORHIDRATO	10 mg/ml	SOLUCIÓN GOTAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
3	PROPINOX + CLONIXINATO DE LISINA	10 mg + 125 mg	TABLETAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
4	SIMETICONA	Hasta 125 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
5	SIMETICONA	Hasta 100 mg / ml	SUSPENSIÓN / SUSPENSIÓN EN GOTAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
AGENTES DE USO TÓPICO PARA EL TRATAMIENTO DE HEMORROIDES				
6	TRIBENOSIDO + LIDOCAINA CLORHIDRATO	5% + 2,12 %	CREMA	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS				
7	ACEITE DE LINAZA	1000 mg	CÁPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
8	ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO + ÁCIDO DOCOSEHEXAENOICO	180 mg + 120 mg	CÁPSULAS	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
9	OMEGA 3	1200 mg	CÁPSULAS BLANDAS DE GELATINA	No superar la dosis recomendada.
ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS				
10	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	Hasta 500 mg	CAPLETAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática.
11	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	300 mg	SUPOSITORIO	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática.
12	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	80 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática.
13	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	160 mg / 5 mL	JARABE / SUSPENSIÓN	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática.

14	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)	100 mg / ml	SOLUCIÓN GOTAS ORALES	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 Kg, Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto periodo de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática.
15	ACIDO ACETIL SALICILICO	500 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS /CAPLETAS	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. No utilizar en pacientes alérgicos al ácido acetil salicilico
ANESTÉSICOS LOCALES				
16	LIDOCAINA	5 g / 100 g	GEL TÓPICO/ UNGÜENTO TÓPICO	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
17	LIDOCAINA	100 mg/ml	SPRAY	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
ANTI-ACNÉ				
18	ACIDO SALICILICO	30 g /100 g	POMADA/UNGÜENTO/GEL	Si persisten los síntomas busque atención médica.
19	ACIDO SALICILICO	1 g / 100 ml	SOLUCIÓN TÓPICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
20	ACIDO SALICILICO + AZUFRE PRECIPITADO	0.3 g+ 1.08g / 30 ml	SOLUCIÓN TÓPICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
21	ACIDO SALICILICO + AZUFRE + SULFATIAZOL	Hasta un 30% de Ácido Salicilico en esta combinación	POMADA DÉRMICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
22	AZUFRE	10 g / 100 g	JABÓN	No ingerir. Suspende si produce irritación.
23	PEROXIDO DE BENZOILO	5 g / 100 g	GEL /JABÓN PASTA	No ingerir.
ANTIBIOTICO OFTAMOLOGICO				
24	OXITETRACICLINA	1%	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA				
25	LEVONORGESTREL	1.5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	Es un anticonceptivo de emergencia, no usar como método de planificación familiar de rutina. Debe ingerirse preferiblemente antes de las 72 horas después del coito, entre más cerca de la hora del coito es más eficaz. Puede tomarse hasta el 5 día (120 horas) pero la eficacia se reduce.
ANTI-DIARREICOS				
26	LOPERAMIDA	2 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No usar en menores de 12 años. La dosis máxima es de 16 mg al día. Si luego de 2 días persisten los síntomas buscar atención médica. La medida terapéutica más importante es la administración de fluidos apropiados y la reposición de electrolitos (Sales de Rehidratación Oral).
27	LOPERAMIDA	2 mg / ml	SOLUCIÓN GOTAS ORALES	No usar en niños menores de 12 años. La dosis máxima es de 16 mg al día. Si luego de 2 días persisten los síntomas buscar atención médica. La medida terapéutica más importante es la administración de líquidos apropiados y la reposición de electrolitos (Sales de Rehidratación Oral).
28	SUBSALICILATO DE BISMUTO	87.33 mg / 5 ml	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico. No utilizar en pacientes alérgicos a la Ácido Acetil Salicilico.
29	SUBSALICILATO DE BISMUTO	262.4 mg	TABLETAS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico. No utilizar en pacientes alérgicos a la ácido acetil salicilico
ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS				

30	DIMENHIDRINATO	50 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No debe utilizarse en niños menores de 2 años. Puede producir sueño. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
31	DIMENHIDRINATO	25 mg	SUPOSITORIO	No debe utilizarse en niños menores de 2 años. Puede producir sueño. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
32	DIMENHIDRINATO	15 mg / 5 mL	JARABE/ SOLUCIÓN ORAL	No debe utilizarse en niños menores de 2 años. Puede producir sueño. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
33	PRIDOXINA + DOXILAMINA	10 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS ENTERICOS	No superar la dosis recomendada.
ANTIFÚNGICOS DERMATOLÓGICOS				
34	ACIDO UNDECLENICO	19,06 g / 100 g	AEROSOL EN SUSPENSIÓN/ SOLUCIÓN TÓPICA	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
35	BIFONAZOL	1%	CREMA	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
36	BIFONAZOL + UREA	1% + 40 %	UNGUENTO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
37	CLOTIRIMAZOL	2 g /100 g	CREMA TÓPICA / GEL/POLVO/ JABÓN PASTA	Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. No ingerir.
38	CLOTIRIMAZOL + PARACLOXILENOL + DIFENHIDRAMINA + VITAMINA A + VITAMINA D3+ AVENA	Hasta concentración máxima de 1% para el Clotrimazol	JABÓN PASTA	Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. No ingerir.
39	KETOCONAZOL	2g / 100 g	POLVO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
40	KETOCONAZOL	1g/100 mL	SHAMPOO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
41	MICONAZOL	2%	POLVO/ CREMA / SOLUCIÓN TÓPICA	No utilizar en niños menores de 2 años. Si persisten los síntomas luego de 5 días buscar atención médica.
42	NISTATINA	100,000 UI / g	CREMA TÓPICA	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
43	TERBINAFINA BASE	1%	GEL	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
44	TERBINAFINA CLORHIDRATO	1%	CREMA/ AEROSOL / SPRAY	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
45	TOLNAFTATO	1%	POLVO/ CREMA/ SOLUCIÓN	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
46	TOLNAFTATO + ALANTOINA	1 g + 0.2 g/100 g	POLVO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
ANTIFÚNGICOS GINECOLÓGICOS				
47	CLOTIRIMAZOL	500 mg	ÓVULO VAGINAL/TABLETA / COMPRIMIDO VAGINAL	Se debe consultar a un médico si los síntomas durante el tratamiento se mantienen después de 3 días o se observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o sangrado.
48	CLOTIRIMAZOL	1 g / 100 mL	SOLUCIÓN DE USO TÓPICO/ SOLUCIÓN ATOMIZADORA	Si los síntomas persisten consultar a su médico. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. No ingerir.
49	CLOTIRIMAZOL	2 g / 100 g (2%)	CREMA VAGINAL/GEL	Se debe consultar a un médico si los síntomas durante el tratamiento se mantienen después de 3 días o se observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o sangrado.
50	MICONAZOL	400 mg	ÓVULO	Si los síntomas persisten consultar a su médico.
51	MICONAZOL	2 g / 100 g	CREMA VAGINAL	No utilizar en niños menores de 2 años. Si persisten los síntomas luego de 5 días buscar atención médica.
ANTIHELMINTICOS				

52	ALBENDAZOL	200 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No se debe administrar Albendazol durante el embarazo o en mujeres que se sospeche embarazo. Consulte a su médico.
53	ALBENDAZOL	400 mg / 10 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No se debe administrar Albendazol durante el embarazo o en mujeres que se sospeche embarazo. Consulte a su médico. Niños entre 1-2 años la dosis es de 200 mg. Una dosis. Consulte a su médico.
ANTIISTAMINICOS				
54	CETIRIZINA DICLORHIDRATO	10 mg	CAPSULAS/TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS	Precaucion al usarse conjuntamente con alcohol. No usar en niños menores de 6 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
55	CETIRIZINA DICLORHIDRATO	5 mg / 5 mL	JARABE	No usar en niños menores de 6 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
56	CLORENFIRAMINA MALEATO	0.5 mg/ mL	JARABE	Produce sedacion. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
57	DIFENHIDRAMINA	50 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	Produce sedacion, tomar antes de dormir. no deberá ser administrado durante un periodo superior a 7 días, ni a menores de 12 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
58	DIFENHIDRAMINA	12.5 mg / 5ml	JARABE / SOLUCIÓN ORAL	Produce sedacion, tomar antes de dormir. no deberá ser administrado durante un periodo superior a 7 días, ni a menores de 12 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
59	HIDROGENOSUCCINATO DE DOXILAMINA	25 mg	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	No superar la dosis recomendada. No se debe administrar durante el embarazo o en mujeres que se sospeche embarazo.
60	LORATADINA	10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debe evaluarse la situación clínica del paciente.
61	LORATADINA	5 mg / 5 mL	JARABE / SOLUCIÓN ORAL	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debe evaluarse la situación clínica del paciente.
62	LORATADINA	1 mg / mL	SOLUCIÓN GOTAS	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debe evaluarse la situación clínica del paciente.
ANTIMIGRAÑOSOS				
63	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + ÁCIDO ACETIL SAUCLÍLICO + CAFEÍNA	250 mg + 250 mg + 65 mg	CAPLETAS/TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad. Incluso a dosis terapéuticas, después de un corto periodo de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. No debe ingerirse alcohol en concomitancia al uso de este medicamento, ya que incrementa los efectos adversos gastrointestinales del ácido acetilsalicílico, y es un factor desencadenante en la irritación crónica producida por el ácido acetilsalicílico. La utilización del ácido acetilsalicílico en pacientes que consumen habitualmente alcohol <i>(tres o más bebidas alcohólicas/cerveza, vino, licor, -al tres o más bebidas alcohólicas/cerveza, vino, licor, -al</i>
64	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CAFEÍNA	Hasta 500 mg + 65 mg	CAPLETAS/ TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad. Incluso a dosis terapéuticas, después de un corto periodo de tratamiento y en pacientes que no tengan insuficiencia hepática. Su uso puede afectar el sueño y el reposo normal.

65	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CAFEÍNA + ERGOTAMINA TRATATO	750 mg + 65 mg + 1 mg	CAPLETAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg, y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento y en pacientes que no tengan insuficiencia hepática. Su uso puede afectar el sueño y el reposo normal.
66	ACETAMINOFÉN + CARBONATO DE CALCIO + TIAMINA MONONITRATO + CAFEÍNA ANHIDRA	500 mg + 280 mg + 84 mg + 65 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada, si los síntomas persisten luego de 72 horas o empeoran antes acuda a su médico. Puede producir somnolencia.
67	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO + CAFEÍNA	650 mg + 65 mg	TABLETAS	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en períodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por más del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos a la ácido acetil salicílico.
68	IBUPROFENO + CAFEÍNA	Hasta 400 mg + 65 mg	CAPSULAS	No usar conjuntamente con otros analgésicos, su uso prolongado puede producir problemas gastrointestinales o hepáticos. No ingerir más de 1200 mg al día.
ANTIPIRURIGINOSOS				
69	ACETATO DE ZINC DIHIDRATADO	5 mg / 5 ml	GEL	Si persisten los síntomas luego de la dosis recomendada busque atención médica.
70	ÁCIDO BÓRICO + CALAMINA + GLICERINA + MENTOL + OXIDO DE ZINC + TALCO		LOCIÓN	Si persisten los síntomas busque atención médica.
71	CALAMINA		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
72	CALAMINA + DIFENHIDRAMINA		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
73	CALAMINA + ÓXIDO DE ZINC		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
74	CALAMINA + ÓXIDO DE ZINC + DIFENHIDRAMINA		LOCIÓN	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
75	PRAMOXINA + ACETATO DE ZINC	1 g + 0.1 g / 100 ml	LOCIÓN	No ingerir.
ANTISÉPTICOS Y ANESTÉSICOS OTOLÓGICOS				
76	ÁCIDO BÓRICO	2.75 g / 100 ml	SOLUCIÓN ÓTICA	No usar si hay sospecha de infección o secreciones. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
77	BENZOCAINA	20 mg / ml	SOLUCIÓN ÓTICA	No aplicar en sospecha de infección o si hay secreciones a través del oído. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES				
78	AGUA OXIGENADA	3% (10 VOLUMENES)	SOLUCIÓN	Solo para uso externo. No ingerir.
79	ALCOHOL ETÍLICO	70% V/V	SOLUCIÓN	Solo para uso externo. No ingerir.
80	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	70% V/V	SOLUCIÓN DE USO TÓPICO	Solo para uso externo. No ingerir.
81	BENZALCONIO CLORURO	10 g/100 g	PASTA JABÓN	No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
82	BENZALCONIO CLORURO	0.5 g / 100 ml	SOLUCIÓN TÓPICA	No ingerir. Solo para uso externo.
83	BENZOCAINA + TRICLOSAN	0.500 g + 0.200 g / 100 ml	LOCIÓN TÓPICA	No ingerir. No superar la dosis recomendada.
84	PARA CHLORO META XILENOL + FENOL LIQUIDO	0.1 g + 0.5 g	JABÓN PASTA	No ingerir. Solo para uso externo.
85	TRICLOSAN	0.1 g / 100 g	POLVO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
DIGESTIVOS, INCLUYENDO ENZIMAS				

86	LACTASA	45 mg	COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
87	PANCREATINA	400 mg	CAPSULAS / TABLETAS / GRAGEAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten por mas de 5 días consultar a su médico.
88	PANCREATINA + DIMETILPOLISILOXANO + BROMOPRIDE	400 mg + 80 mg + 5 mg	CAPSULAS / TABLETAS / GRAGEAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten por mas de 5 días consultar a su médico.
89	PANCREATINA + SIMETICONA	400 mg + 80 mg	CAPSULA / TABLETAS / GRAGEAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten por mas de 5 días consultar a su médico.
EMOLIENTES Y PROTECTORES				
90	ÓXIDO DE ZINC		LOCIÓN/CREMA DÉRMICA	No ingerir.
91	VITAMINA A PALMITATO + VITAMINA D3 + ÓXIDO DE ZINC		UNGÜENTO/CREMA	No ingerir. Solo para uso externo.
92	VITAMINA E + EXTRACTO DE ALOE		UNGÜENTO/CREMA	No ingerir. Solo para uso externo.
ESCABICIDAS				
93	PERMETRINA	Hasta 2 g/ 100 ml	SHAMPOO / LOCIÓN / POMADA	No ingerir.
FÁRMACOS USADOS EN LA DEPENDENCIA A NICOTINA				
94	NICOTINA RESINATO	20 mg (Equiv. A 4 mg de Nicotina)	TABLETAS / COMPRIMIDOS DE GOMA MASTICABLE	No usar en menores de 18 años sin prescripción médica.
FÁRMACOS PARA ALTERACIONES RELACIONADAS CON LA ÁCIDIZ E INDIGESTIÓN				
95	ÁCIDO ACETIL SALICILICO + CAFEÍNA + BICARBONATO DE SODIO + ÁCIDO CÍTRICO	500 mg + 65 mg + 1485 mg + 1060 mg	TABLETAS / CAPLETAS/ COMPRIMIDOS / COMPRIMIDOS EFFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en períodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. Este medicamento no debe emplearse como sustituto del sueño. No utilizar en pacientes alérgicos a la acido acetil salicilico.
96	ÁCIDO ACETIL SALICILICO + CAFEÍNA + BICARBONATO DE SODIO + ÁCIDO CÍTRICO	500 mg + 65 mg + 2000 mg + 2000 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en períodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. Este medicamento no debe
97	ALGINATO DE SODIO + BICARBONATO DE SODIO	2.67 g + 2.50 g / 100 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
98	BICARBONATO DE SODIO	2.3 g /5 g	POLVO EFFERVESCENTE PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
99	BICARBONATO DE SODIO + CARBONATO DE MAGNESIO + CARBONATO DE CALCIO	100 mg + 75 mg + 100 mg	CAPSULAS	Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana.
100	BICARBONATO DE SODIO GRADO FINO + CARBONATO DE SODIO ANHIDRO	2.15 g + 0.5 g / 5 g	POLVO EFFERVESCENTE	No superar la dosis recomendada.
101	BICARBONATO DE SODIO + ALGINATO DE SODIO	125 mg + 133.5 mg/5 mL	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
102	BICARBONATO DE SODIO + SULFATO DE MAGNESIO	2.3 g + 0.9g /5 g	POLVO EFFERVESCENTE PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
103	BICARBONATO DE SODIO + ÁCIDO CÍTRICO + CARBONATO SODICO	2.3g + 2.19g + 0.45g /5 g	POLVO EFFERVESCENTE PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
104	ESOMEPRAZOL	20 mg	CAPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA	Indicado solo en caso de hiperacidéz gástrica por corto tiempo (1 a 3 días)

105	HIDROTALCITA	500 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
106	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO + SIMETICONA	520 mg + 480 mg + 40 mg/5 ml	SUSPENSIÓN ORAL	No administrar en menores de 15 años. Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana. No administrar en personas con estreñimiento.
107	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO + SIMETICONA	520 mg + 480 mg + 40 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No administrar en menores de 15 años. Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana. No administrar en personas con estreñimiento.
108	HIDROXIDO DE MAGNESIO	480 mg / 5 ml	SUSPENSIÓN ORAL	No usar de manera crónica. No usar como laxante en niños.
109	HIDROXIDO DE MAGNESIO + OXIDO DE MAGNESIO	1.08 g + 4.68 g / 8 g	POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL	No administrar en menores de 15 años. Si luego de tres días persisten los síntomas se debe acudir a un médico o a la unidad de salud más cercana. No administrar en personas con estreñimiento.
110	MAGALDRATO + SIMETICONA	400 mg + 30 mg / 5 ml	SUSPENSIÓN	Evitar el uso prolongado. Si persisten los síntomas buscar atención médica.
111	MAGALDRATO + SIMETICONA	800 mg + 40 mg	COMPRIMIDOS MASTICABLES	Si persisten los síntomas buscar atención médica.
112	OMEPRAZOL	20 mg	CAPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA	Indicado solo en caso de hiperacidez gástrica por corto tiempo (1 a 3 días)
113	RANITIDINA	150 mg	TABLETAS	Indicado solo en caso de hiperacidez gástrica por corto tiempo (1 a 3 días)

FÓRMULAS PARA REHIDRATACIÓN ORAL

114	CLORURO DE SODIO + CLORURO DE POTASIO + CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO + CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO + ÁCIDO LÁCTICO + HIDRÓXIDO DE SODIO + GLUCOSA	Cada 100 ml contiene: Cloruro de Sodio 0.012 g + Cloruro de Potasio 0.149 g + Cloruro de Calcio Dihidratado 0.030 g + Cloruro de Magnesio Hexahidratado 0.041 g + Ácido Láctico 0.252 g + Hidróxido de Sodio 0.090 g + Glucosa 5.000 g	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.
115	CLORURO DE SODIO + CLORURO DE POTASIO + MONOHIDRATO DE DEXTROSA (EQUIVALENTE A DE DEXTROSA) + CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO + SUCRALOSA	Cloruro de Sodio USP 0.263 g + Cloruro de Potasio USP 0.150 g + Monohidrato de Dextrosa USP 1.485 g Equivalente a Dextrosa 1.35 g + Citrato de Sodio Dihidratado USP 0.294 g + Sucralosa USP 13.8 mg	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.
116	CLORURO DE SODIO + CITRATO DE POTASIO MONOHIDRATADO + GLUCONATO DE ZINC + GLUCOSA MONOHIDRATADA + CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO	Cloruro de Sodio 207.600 mg + Citrato de Potasio Monohidratado 216 mg + Gluconato de Zinc 6.100 mg + Glucosa Monohidratada 2.5 mg + Citrato de Sodio Dihidratado 94 mg / 100 ml	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.
117	DEXTROSA ANHIDRA + ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO + CITRATO DE POTASIO + CLORURO DE SODIO + CITRATO DE SODIO	Cada 100 ml contienen: Dextrosa Anhídrida 2.500 g + Ácido Cítrico Anhídrido 0.246 g + Citrato de Potasio 0.216 g + Cloruro de Sodio 0.205 g + Citrato de Sodio 0.098 g	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.
118	DEXTROSA + FRUCTOSA + CLORURO DE SODIO + CITRATO DE POTASIO	Dextrosa 2.000 g + Fructosa 0.500 g + Cloruro de Sodio 0.204 g + Citrato de Potasio 0.220 g	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.

119	DEXTROSA MONOHIDRATADA + CLORURO DE SODIO + CLORURO DE POTASIO + CLORURO DE CALCIO + CLORURO DE MAGNESIO + LACTATO DE SODIO	Cada 100 mL Contiene: Dextrosa Monohidratada USP 5 g + Cloruro de Sodio USP 15 mg + Cloruro de Potasio USP 150 mg + Cloruro de Calcio USP 29 mg + Cloruro de Magnesio USP 40 mg + Lactato de Sodio USP 314 mg	SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.
120	OTRAS SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	Según fórmula OMS: Por cada litro (1000 ml) Cloruro de Sodio 2.6 g + Glucosa Anhidra 13.5 g + Cloruro de Potasio 1.5 g + Citrato Trisódico 2.9 g	POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL/ SOLUCIÓN ORAL	Si persiste la diarrea luego de 24 horas, se incrementan las deposiciones o presenta fiebre o datos de deshidratación acudir al médico.
HIPNÓTICOS Y SEDANTES				
121	MELATONINA	3 mg	CÁPSULAS	Produce somnolencia.
LAXANTES				
122	GLICERINA	1.2 g/ SUPOSITORIO NIÑOS	SUPOSITORIO	No usar en menores de dos años.
123	GLICERINA	2.4 g / SUPOSITORIO ADULTOS	SUPOSITORIO	No usar en menores de dos años.
124	LACTUOSA	3.33 g / 5 mL	SOLUCIÓN ORAL	En caso de efecto terapéutico insuficiente después de varios días de tratamiento, se aconseja consultar al médico.
125	PICOSULFATO DE SODIO	10 mg	TABLETAS	No superar la dosis recomendada.
LUBRICANTES Y DESCONGESTIVOS OFTALMOLÓGICOS				
126	CARBOMER	2.50 mg/g	GEL OFTÁLMICO	No superar la dosis recomendada.
127	CARBOMERO + MANITOL	0.150 g + 4.600 g/g	GEL OFTÁLMICO	No superar la dosis recomendada.
128	CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA	5 mg/ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
129	EXTRACTO DE CAMOMILA	0.25 mg / ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
130	HIDROXIPROPIL GUAR	6 mg / ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
131	HIDROXIPROPIL METIL CELULOSA + DEXTRAN	3 mg + 1 mg/ ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada
132	POULETILENGLICOL 400 + PROPILENGLICOL	4.0 mg + 3.0 mg / ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada. Si persisten los síntomas buscar atención médica.
133	SULFATO DE CONDRITINA + HIPROMELOSA	1.0 mg + 2.0mg/ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	No superar la dosis recomendada.
134	TETRAHIDROZOLINA	0.50 mg/ml	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Uso en niños mayores de 6 años. No superar la dosis recomendada, si persisten los síntomas consulte a su médico. No utilizar con pacientes con glaucoma.
MICROORGANISMOS ANTI-DIARREICOS				
135	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII	2 Millardos (2 Billones)	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
136	ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII	2 Billones / 5 ml	SUSPENSIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
137	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	170 mg / 100 g	POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
138	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	170 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
139	SACCHAROMYCES BOULARDII	200 mg	CÁPSULAS	No superar la dosis recomendada.
140	SACCHAROMYCES BOULARDII	250 mg / Sobre	POLVO PARA SUSPENSIÓN/ SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
MUCOLÍTICOS				
141	AMBROXOL CLORHIDRATO	30 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
142	AMBROXOL CLORHIDRATO	30 mg / 5 mL	SOLUCIÓN ORAL/ JARABE	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
143	AMBROXOL CLORHIDRATO	7.5 mg / mL	SOLUCIÓN ORAL GOTAS	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.
144	AMBROXOL CLORHIDRATO	75 mg	CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten después de 5 días se debe acudir al médico o a la unidad de salud más cercana.

145	BROMHEXINA CLORHIDRATO	8 mg		TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPSULAS BLANDAS	No usar en menores de 2 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
146	BROMHEXINA CLORHIDRATO	8 mg / 5ml		JARABE	No usar en menores de 2 años. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS					
147	ÁCIDO BENZOICO + ÁCIDO SALICILICO	100 mg + 200 mg / 5 g		UNGÜENTO	Uso tópico. No ingerir. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
148	ÁCIDO SALICILICO + ÁCIDO LÁCTICO	0.167g + 0.167g / ml		SOLUCIÓN TÓPICA	Si persisten los síntomas busque atención médica.
149	MINOXIDIL	5g/100ml		SOLUCIÓN TÓPICA	Usar con precaución en pacientes cardiopatas medicados y en aquellos pacientes que utilicen los inhibidores de la PDFS (Sildenafil y sustancias relacionadas)
PREPARADOS DE USO NASAL					
150	CLORURO DE SODIO	70 mg / mL		SOLUCIÓN NASAL/ SOLUCIÓN SPRAY NASAL/ SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN	En caso de sospecha de infección o si los síntomas persisten luego de 48 horas acudir al médico
151	OXIMETAZOLINA	0.50 mg / mL		SOLUCIÓN NASAL	No usar en menores de 6 años. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
152	OXIMETAZOLINA + DEXPANTENOL	0.50 mg + 20.33 mg / mL		SOLUCIÓN NASAL	No usar en menores de 6 años. No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
153	XILOMETAZOLINA	1 mg / mL		SOLUCIÓN NASAL/ SOLUCIÓN NASAL SPRAY DOSIFICADOR	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.
PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS					
154	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA	20 %		GEL	Solo uso tópico. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
155	EXTRACTO DE FLUIDO DE RUIBARBO + ÁCIDO SALICILICO	50 mg + 10 mg / mL		SOLUCIÓN TÓPICA	No superar la dosis recomendada.
156	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	0.12 g / 100 mL		SOLUCIÓN BUICAL	Solo uso topico. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y QUEMADURAS					
157	ACETATO DE ALUMINIO	3 mg / 5 mL (0.060 g/100 mL)		LOCIÓN	Si persisten los síntomas luego de la dosis recomendada busque atención médica.
158	ACETATO DE CALCIO + SULFATO DE ALUMINIO	36.45 g + 51.80 g / 100 g		POLVO PARA SOLUCIÓN TÓPICA	No observaciones
159	CALCIO CARBONATO	90 g / 100 g		POLVO	No superar la dosis recomendada, no usar en problemas renales sin autorización medica.
160	EXTRACTO DE CENTELLA ACUATICA	2 g/100 g		POLVO/ CREMA TÓPICA	No superar la dosis recomendada
161	SULFADIAZINA DE PLATA	1 g / 100 g		CREMA/POLVO	No ingerir, uso tópico.
162	SULFADIAZINA DE PLATA + PRAMOXINA + OXIDO DE ZINC + VITAMINA A + VITAMINA E	10 mg + 10 mg + 100 mg + 250 U.I. + 30 U.I./g		CREMA TÓPICA	No ingerir, uso tópico.
PREPARADOS PARA LA GARGANTA					
163	ALFA - AMILASA	3000 U.CEIP		TABLETAS / COMPRIMIDOS GRAGEADOS	No superar la dosis recomendada.
164	ALFA - AMILASA	1000 U CEIP / 5 mL		JARABE	No superar la dosis recomendada.
165	BENZOCAINA + CLORURO DE DECUALINIO	10 mg + 0.25 mg		PASTILLAS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
166	BENZOCAINA + CLORHEXIDINA DIHIDROCLORURO	2 mg + 5 mg		TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
167	CLORURO DE OXIBUPROCAINA + CLORURO DE CETILPIRIDINO	0.20000 mg + 1.00000 mg		TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.

PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO		20%	LÍQUIDO	No superar la dosis recomendada.
168	ACEITE ESENCIAL DE GOMENOL			La amantadina deberá usarse con precaución en pacientes con disfunción hepática. Se han observado algunos casos un aumento de las transaminasas. La amantadina puede producir insomnio. La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.
169	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + AMANTADINA CLORHIDRATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO	Hasta 500 mg + 50 mg+ 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.
170	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + DEXCLORENERAMINA MALEATO	100 mg + 0.5 mg / mL	SOLUCIÓN ORAL GOTAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.
171	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + FENILEFRINA HCL + CETRIZINA DICLORHIDRATO	325 mg + 5 mg + 5 mg / 5 mL	JARABE	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días persisten los síntomas acudir a su médico o a la unidad de salud mas cercana.
172	ACETAMINOFÉN + FENILEFRINA HCL + MALEATO DE CLOFFENIRAMINA	500 mg + 5 mg + 2 mg	CAPLETAS	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días persisten los síntomas acudir a su médico o a la unidad de salud mas cercana.
173	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + FENILEFRINA CLORHIDRATO + CETRIZINA DICLORHIDRATO	Hasta 500 mg + 10 mg + 5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS/CAPSULAS/ POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática.
174	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + CLOFFENIRAMINA MALEATO + (DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO O BROMHEXINA CLORHIDRATO) + FENILEFRINA CLORHIDRATO	Hasta 500 mg + 5 mg + (30 mg Dextrometorfano o 8 mg Bromhexina) + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS/CAPSULAS/ POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	La dosis total de acetaminofén/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 kg. Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.

175	ACETAMINOFÉN + BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO + DOXILAMINA SUCCINATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO	325 mg + 10 mg + 6.25 mg + 5 mg	CAPSULAS DE GELATINA BLANDA	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.
176	ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL) + GUAIFENESINA + CLORFENIRAMINA MALEATO + FENILEFRINA + (DEXTROMETORFANO ó BROMHEXINA)	Hasta 125 mg + 100 mg + 5mg + 5 mg + (15 mg Dextrometorfano ó 4 mg Bromhexina) / 5 ml	JARABE	No superar la dosis recomendada. Usar con precaución en hipertensos.
177	ACETAMINOFÉN + ÁCIDO ASCÓRBICO + BITARTRATO DE FENILEFRINA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA	162 mg +30 mg + 3.89 mg + 1 mg	TABLETAS EFFERVESCENTES	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 Kg, Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto periodo de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.
178	ACETAMINOFÉN + FENILEFRINA + SAUCILAMIDA + CLORFENIRAMINA + CAFEINA	500 mg + 10 mg + 100 mg + 3 mg + 10 mg	CAPLETAS	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 Kg, Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto periodo de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.
179	ACETAMINOFÉN + BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA + GUAIFENESINA	250 mg + 10 mg + 5 mg + 200 mg	CAPSULAS DE GELATINA BLANDA	La dosis total de acetaminofen/paracetamol no debe sobrepasar los 80 mg/kg/día para niños con un peso menor de 37 Kg, Y 3 g al día en adultos y niños con más de 38 kg. Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto periodo de tratamiento, aun en pacientes sin insuficiencia hepática. Si luego de tres días de tratamiento persisten los síntomas acudir a su médico o a una unidad de salud.
180	ÁCIDO ACETIL SAUCILICO + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + FENILEFRINA CLORHIDRATO	Hasta 500 mg AAS + 2 mg + 15 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos a la ácido acetil salicílico.
181	ÁCIDO ACETIL SAUCILICO + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + FENILEFRINA BITARTRATO	500 mg AAS + 5 mg + 15 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS EFFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos a la ácido acetil salicílico.

182	ACIDO ACETIL SALICILICO + BITARTRATO DE FENILEFRINA + MALEATO DE CLOFENIRAMINA	500 mg +8 mg + 2 mg	TABLETAS EFERVESCENTES	El alcohol puede incrementar el riesgo de daño gastrointestinal cuando se toma junto con ácido acetilsalicílico. Puede producir sangrado de tubo digestivo alto, no ingerir en periodos cercanos a una cirugía por el incremento del riesgo de hemorragia. No usar por mas del tiempo y dosis recomendada. Si después de 3 días persisten los síntomas acudir a su médico o la unidad de salud más cercana. No utilizar en pacientes alérgicos a la ácido acetil salicílico.
183	DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA	12.50 mg + 5 mg / 5 ml	JARABE	Produce sedación. No administrar a niños menores de 12 años. Por la fenilefrina usar con precaución en hipertensos y cardiopatas. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
184	LORATADINA / FENILEFRINA	5 mg + 5 mg / 5 ml	JARABE	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico. No usar en hipertensos y cardiopatas.
185	LORATADINA / FENILEFRINA HCl	5.0 mg + 30 mg	TABLETAS DE LIBERACIÓN SOSTENIDA	Si el paciente empeora o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico. No usar en hipertensos y cardiopatas.
186	MENTOL + ALCANFOR USP + GOMENOL + ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO	0.250 g +3.000 g + 2.000 ml + 4.000 ml /100 ml	SOLUCIÓN INHALANTE	No ingerir.
187	MENTOL + EXTO. FLUIDO DE TOLU + BENJUI + EUCALIPTO + GOMENOL	1 g + 10ml + 10 ml + 10 ml + 1 ml /100 ml	SOLUCIÓN INHALANTE	No ingerir.
PRODUCTOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR				
188	ALCANFOR		POMADA/CREMA	No ingerir.
189	ALCANFOR + TREMENTINA + MENTOL + ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO + TIMOL		UNGÜENTO	No ingerir.
190	GLUCOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA + METIL SUFONIL METANO	500 mg + 400 mg + 300 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
191	IBUPROFENO + VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + IBUPROFENO	Hasta 400 mg de Ibuprofeno + 50 mg + 100 mg + 100 mcg	CAPLETAS	No superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten consultar a su médico.
192	MENTOL + ALCANFOR + SAUCILATO DE METILO	1.76 g + 5.86 g + 7.23 g / 100 g	CREMA	No ingerir.
193	MENTOL + SAUCILATO DE METILO	2.857 g + 18.240 g / 100 g	CREMA	No ingerir.
194	MENTOL		UNGÜENTO/CREMA	No ingerir.
195	MENTOL + SAUCILATO DE METILO + EUCALIPTOL		UNGÜENTO/CREMA	No ingerir.
PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMÁTICOS				
196	CLONIXINATO DE LISINA	125 mg	CAPSULAS/ TABLETAS / COMPRIMIDOS	No usar en menores de 18 años. No superar la dosis recomendada.
197	DICLOFENAC DIETILAMONIO	Hasta 2.32 %	AEROSOL / GEL	Solo uso topico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
198	DICLOFENAC DIETILAMONIO + MENTOL + SAUCILATO DE METILO	1.2 g + 4 g + 3 g / 100 g	GEL	Solo uso topico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
199	DICLOFENAC SÓDICO	50 mg	TABLETAS	No superar la dosis recomendada ni prolongar su uso. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
200	DICLOFENAC + VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12	50 mg + 50 mg + 50 mg + 1,000 mcg	COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada ni prolongar su uso. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
201	DICLOFENAC SÓDICO	1 g/100 g	GEL TÓPICO	Solo uso topico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

202	IBUPROFENO	10 g / 100 g	GEL	Si persisten los síntomas busque ayuda médica.
203	IBUPROFENO	400 mg	CAPLETAS/GRAGEAS/ TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPSULAS	No usar conjuntamente con otros analgésicos, su uso prolongado puede producir problemas gastrointestinales o hepáticos. No ingerir más de 1200 mg al día.
204	IBUPROFENO	100 mg	SUPOSITORIO	No usar conjuntamente con otros analgésicos, su uso prolongado puede producir problemas gastrointestinales o hepáticos.
205	IBUPROFENO	50 mg / mL	GOTAS ORALES EN SUSPENSIÓN	No usar en niños menores de dos años. En los niños mayores de dos años no usar por más de 48 horas. Puede producir problemas gastrointestinales, renales y hepáticos.
206	IBUPROFENO + N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA	400 mg + 20 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS	No usar en niños menores de 2 años. Puede producir problemas gastrointestinales, renales y hepáticos.
207	NAPROXENO SÓDICO	275 mg	CAPSULAS / TABLETAS / COMPRIMIDOS	Uso en mayores de 12 años. Puede incrementar riesgo de problemas hepáticos, renales y gastrointestinales. No usar conjuntamente con otros analgésicos, sin prescripción médica.
208	NAPROXENO SÓDICO	5.5 g / 100 g	GEL TÓPICO	Uso en mayores de 16 años, la dosis máxima es de 600 mg. Puede incrementar riesgo de problemas hepáticos, renales y gastrointestinales. No usar conjuntamente con otros analgésicos, sin prescripción médica.
209	PIROXICAM	0.5 g / 100 g	GEL	Si persisten los síntomas buscar atención médica.
SUPLEMENTOS MINERALES				
210	ACETATO DE CALCIO	700 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
211	CALCIO GLUCONATO	600 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
212	CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3	1500 mg + 400 UI	TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS/CAPSULAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
213	CARBONATO DE CALCIO + OXIDO DE MAGNESIO + SULFATO DE ZINC	834.0 mg + 220.5 mg+ 12.35 mg	TABLETAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
214	CITRATO DE CALCIO	1500 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS/CAPSULAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
215	CITRATO DE CALCIO + VITAMINA D3	1500 mg + 400 UI	TABLETAS / COMPRIMIDOS/ CAPLETAS/CAPSULAS	No usar si hay problemas renales o cardíacos.



216	CITRATO POTÁSICO	1080 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	No superar la dosis recomendada. No usar con problemas renales o cardíacos sin prescripción médica.
217	FOSFATO DE CALCIO TRIBÁSICO	5.0 g / 100 g	GRANULADO	No usar si hay problemas renales o cardíacos.
218	FUMARATO FERROSO + ÁCIDO FÓLICO + CIANOCOBALAMINA (B12)	325 mg + 800 mcg + 50 mcg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada.
219	GLUCONATO FERROSO	300 mg / 10 mL	SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
220	HIERRO COMO COMPLEJO DE HIERRO III	100 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
221	HIERRO + ZINC + COBRE + ACIDO FOLICO + VITAMINA B12 + VITAMINA B6	HIERRO 24 mg (como Fumarato Ferroso 73.0 mg) + ZINC 12 mg (como Sulfato de Zinc Monohidrato 32.9 mg) + COBRE 2 mg (como Sulfato de Cobre seco 5.6 mg) + Folacina (como Acido Folicco 500.0 ug) + VITAMINA B12 10 ug (Como Cianocobalamina) + VITAMINA B6 (como Piridoxina Clorhidrato 5.0 mg)	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada.

SUPRESORES DE LA TOS Y EXPECTORANTES

222	CARBOXIMETILCISTEINA + DEXTROMETORFANO + CLOFENIRAMINA	150 mg + 5.0 mg + 2.5 mg / 5 mL	JARABE	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
223	DEXTROMETORFANO	15 mg / 5 mL	JARABE	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
224	DEXTROMETORFANO	30 mg	TABLETAS/ COMPRIMIDOS	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
225	DEXTROMETORFANO + GUAIFENESINA	30 mg + 200 mg	CAPLETAS	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico.
226	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + CLOFENIRAMINA MALEATO	30 mg. + 4 mg	TABLETAS / COMPRIMIDO	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico. Si después de 3 días persisten los síntomas o empeoran acudir a un médico. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

227	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO + MIEL DE ABEJA + CLOREHIRAMINA	15 mg + 350 mg + 5 mg / 5 mL	JARABE	No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, ya que puede deteriorar la expectoración y aumentar así la resistencia de las vías respiratorias. No usar de manera prolongada. No usar en niños menores de 12 años salvo que sea indicado por un médico.
228	GUAIFENESINA	100 mg / 7.5 mL	JARABE	No recomendado durante el embarazo. Si los síntomas persisten consulte a su médico.
229	SULFOGUAYACOLATO + DEXTROMETORFANO + CLOREHIRAMINA	150 mg + 5mg + 2 mg / 5ml	JARABE	No usar en niños menores de 2 años. Si después de 3 días persisten los síntomas o empeoran acudir a un médico.
TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA				
230	SILIMARINA	200 mg	TABLETA / COMPRIMIDO / CAPSULA/GRAGEA	No superar la dosis recomendada.
VASOPROTECTORES				
231	RUSCUS ACULEATUS + ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) + LACTOBACILLUS SPROGENES	20.00 mg + 40.00 mg + 8.300 mg	TABLETA / COMPRIMIDOS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
VITAMINAS				
232	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO + EXTRACTO DE MALTA	No debe exceder el 150 % de la dosis diaria recomendada	EMULSIÓN	No superar la dosis recomendada.
233	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO + VITAMINA E	No debe exceder el 150 % de la dosis diaria recomendada	CAPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
234	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO EQUIVALENTE A VIT. A + ACEITE DE HIGADO DE BACALAO EQUIVALENTE A VIT. D3 + VITAMINA A PALMITATO EQUIVALENTE A VIT. A + VITAMINA D3 + FOSFATO TRIBÁSICO DE CALCIO + FOSFATO MONOBÁSICO DE CALCIO	630 UI + 63 UI + 501 UI + 50.1 UI + 0.0935 g + 0.0546 g/ 100 mL	EMULSIÓN	No superar la dosis recomendada.
235	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO + VITAMINA A PALMITATO + VITAMINA D	ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 0.4567 g + VITAMINA A 1331,25 UI + VITAMINA D 1331,25 UI / 100 mL	EMULSIÓN	No superar la dosis recomendada.
236	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)	2000 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS MASTICABLES/ CAPSULAS/ COMPRIMIDOS EFFERVESCENTES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica.
237	ACIDO ASCORBICO + ASCORBATO DE SODIO	220 mg + 336 mg	TABLETAS MASTICABLES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica.
238	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) + ZINC	1000 mg + 10 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS / TABLETAS Y COMPRIMIDOS EFFERVESCENTES	La duración del tratamiento en general no debe superar 10 días continuos. Si los síntomas no mejoran o empeoran después de 7 días de tratamiento, buscar atención médica. Tratamiento de estados carenciales de vitamina C, en adultos y adolescentes a partir de 14 años.
239	ÁCIDO FÓLICO	5 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
240	ÁCIDO FÓLICO	5 mg / 5 ml	JARABE	No superar la dosis recomendada.
241	ÁCIDO FÓLICO + VITAMINA B 12	5 mg + 500 mcg / 10 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.
242	MECOBALAMINA	500 mcg	TABLETAS / COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
243	VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12	50 mg + 50 mg + 200 mcg/ 15 mL	JARABE	No superar la dosis recomendada.

244	VITAMINA B1 + VITAMINA B6 + VITAMINA B12	100 mg + 100 mg + 200 mcg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTAS/CAPSULAS/ CAPLETAS	No superar la dosis recomendada.
245	VITAMINA B12 + ÁCIDO FÓLICO	0.50 mg + 5.0 mg	TABLETAS/ COMPRIMIDOS	No superar la dosis recomendada.
246	VITAMINA B12 + ÁCIDO FÓLICO	250 mcg + 2.5 mg / 5 ml	SOLUCIÓN ORAL	No superar la dosis recomendada.
247	VITAMINA E (ALFATOCOFERIL ACETATO)	400 UI	CAPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
248	VITAMINA D3 + VITAMINA C + ZINC	200UI + 30mg + 2.5 mg	GOMITAS MASTICABLES	No superar la dosis recomendada.
249	VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS EN COMBINACIÓN	Vitamina A 2,664 UI + Vitamina B1 3 mg + Vitamina B2 3.4 mg + Vitamina B6 4 mg + Vitamina B12 2.2 mcg + Vitamina C 70 mg + Vitamina D 400 UI + Vitamina E 10 mg + Nicotinamida 17 mg + Acido Folico 600 mcg + Calcio 125 mg + Hierro 30 mg + Zinc 15 mg	CAPSULAS BLANDAS	No superar la dosis recomendada.
250	VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS EN COMBINACIÓN	Cianocobalamina (Vitamina B12) 0.050 mg + Tiamina HCl (Vit. B1) 10 mg + Piridoxina HCl (Vit. B6) 10 mg + L-Lisina HCl 300mg + Nicotinamida 25 mg + L-Glutamina 25 mg + D- Pantenol 15 mg / 5 ml	JARABE	No superar la dosis recomendada.
251	OTRAS VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS EN COMBINACIÓN	No debe exceder el 150 % de la dosis diaria recomendada	TABLETAS/COMPRIMIDOS/ JARABE/ SOLUCIÓN ORAL/POLVO	No superar la dosis recomendada.
PRODUCTOS NATURALES				
252	COLA DE CABALLO (EQUISETUM ARVENSE)	500 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada
253	EXTRACTO DE COLA DE CABALLO, EXTRACTO DE SAW PALMETTO, EXTRACTO DE ACHIOLE, EXTRACTO DE TOMATE, EXTRACTO DE JENGIBRE, EXTRACTO DE CEBOLLA, VITAMINA B6, B12, VITAMINA E Y SULFATO DE ZINC	13.0 mg + 50.0 mg + 15.0 mg + 25.0 mg + 7.5 mg + 15.0 mg + 2.5 mg + 8.0 mcg + 1.0 UI + 0.5 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada
254	EXTRACTO DE GINGKO BILOBA	80 mg	TABLETAS / COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	No superar la dosis recomendada. No usar conjuntamente acido acetil salicilico o cualquier otro antiplaquetario, para evitar el riesgo de sangrado.
255	EXTRACTO ESTANDARIZADO DE GINGKO BILOBA	40 mg/ml	SOLUCIÓN GOTAS	No superar la dosis recomendada. No usar conjuntamente acido acetil salicilico o cualquier otro antiplaquetario, para evitar el riesgo de sangrado.
256	EXTRACTO HOJA DE HIEDRA DESECADA (HEBERA HELIX)	7.0 mg / ml	JARABE	No superar la dosis recomendada.
257	EXTRACTO FLUIDO DE COLA DE CABALLO, EXTRACTO FLUIDO DE SAW PALMETTO, EXTRACTO FLUIDO DE ACHIOLE, EXTRACTO FLUIDO DE TOMATE, EXTRACTO DE JENGIBRE, EXTRACTO DE CEBOLLA, VITAMINA B6, B12, VITAMINA E Y SULFATO DE ZINC	7.5 mg+25.0 mg+6.25 +mg+11.5 mg+7.5 mg+3.75 mg+1.25 mg+4.0 mcg+0.5 mg+0.5 mg	JARABE	No superar la dosis recomendada
258	EXTRACTO NORMALIZADO DE LA CORTEZA DE PINUS PINASTER (PINO MARÍTIMO) PYCNOGENOL	60 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada
259	EXTRACTO SECO DE ANAMU (PETIVERIA ALLIACEA; RAIZ)	500 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada
260	EXTRACTO SECO DE CHANCA PIEDRA, EXTRACTO SECO DE BARBAS ELOTE, EXTRACTO SECO DE COLA DE CABALLO, EXTRACTO SECO DE CEBOLLA, EXTRACTO SECO DE ABEDUL	400.0 mg+90.0 mg+75.0mg+50.0 mg+30.0 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada
261	EXTRACTO SECO DE CASCARA DE NARANJA + EXTRACTO SECO DE GUARANA + EXTRACTO SECO DE ACAI BERRY + EXTRACTO SECO DE TÉ VERDE + EXTRACTO SECO DE CHITOSAN + L-CARNITINA	200 mg + 50 mg + 100 mg + 100 mg + 100 mg + 100 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada

262	EXTRACTO SECO DE SAW PALMETTO (SERENOA REPENS) ORIGEN VEGETAL, PARTE USADA: HOJAS	320 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada
263	GOTU KOILA	500 mg	CAPSULAS	No superar la dosis recomendada.
264	AGUA ESTERIL	TODOS LOS DEMAS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS		No observaciones
			SOLUCION ESTERIL	

